

# AGEROLESE

**AREA DI ORIGINE:** Regione Campania

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

## CARATTERI TIPICI:

**Taglia:** media con tronco abbastanza armonioso.

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* elastica, cute perianale e perivulvare di colore carnicino, giallo paglierino tendente al rosa, rima vulvare e apertura anale nerastre.

**vacche** - colore bruno con tonalità più chiara nella regione addominale; riga dorso lombare più chiara del colorito del mantello; **tori** - nero maltinto con riga dorso lombare chiara.

**Testa:** leggera, breve, sincipite leggermente convesso con depressione centrale poco marcata, *ciuffo* al sincipite dello stesso colore del mantello; *profilo* concavo nella regione frontale; *occhi* grandi vivi con i margini palpebrali dello stesso colore del mantello; *orecchie* di media grandezza con folti peli chiari nell'interno e sul bordo del padiglione auricolare; *musello* nero contornato da alone bianco spesso incompleto; *lingua* di colore ardesia con nodo carnicino; *corni* leggere di media lunghezza, incurvate nei tori, dirette di lato, in alto e in avanti nelle vacche.

**Anteriore:** *collo* leggero con giogaia ridotta; *garrese* non rilevato né aperto; *spalle* ben aderenti al tronco; *torace* ampio e profondo; *arti* proporzionati e poco muscolosi, *articolazioni* bene sviluppate e asciutte, *appiombi* regolari; *piedi* forti e ben serrati, con unghielli neri.

**Linea dorsale:** rettilinea, *lombi* di buona conformazione.

**Groppa:** dritta; *coda* con attacco alto e sottile con fusto fino ai garretti con fiocco abbondante di colore nero.

**Arti posteriori:** appiombi regolari; *cosce* muscolose; *garretti* asciutti; *piedi* corretti con unghielli come negli anteriori; *pastoie* corte e forti.

**Caratteri sessuali:** **tori** - *scroto* di colore carnicino; *pischiolare* di colore nero; **vacche** - *mammella* ben sviluppata; *quarti* bene evidenti conformati a fiasco; *capezzoli* grossi e lunghi; *vene perimammarie* bene evidenti; *vene sottocutanee addominali* assai sviluppate.

**Difetti morfologici:** macchie bianche estese nelle regioni addominali e inguinali; assenza della riga mulina; taglia, mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## Difetti che comportano l'inibizione alla riproduzione:

- macchie bianche estese nelle regioni addominali e inguinali;
- assenza della riga mulina;
- mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.