

BURLINA

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI:

Taglia: media

Mantello e pigmentazione: *pelle* sottile, elastica, facilmente staccabile dai tessuti sottostanti; mantello nero pezzato;

Testa: leggera, allungata; *profilo* rettilineo leggermente concavo; *occhi* vivaci; *orecchie* grandi; *narici* lunghe; *musello* largo; *mascelle* larghe; *corna* leggere, incurvate dirette in avanti, e in alto.

Anteriore: armonico e ben sviluppato; *collo* leggero con giogaia sviluppata; *garrese* non aperto e non acuminato; spalle aderenti e poco muscolose; *petto* largo; *arti* poco muscolosi; *piedi* con unghioni solidi e ben sviluppati con zoccolo che si allarga uniformemente verso il contorno plantare.

Linea dorsale: diritta; spina dorsale non molto pronunciata; *lombi* larghi.

Groppa: tendenzialmente quadrata, leggermente inclinata; *coda* ben attaccata, fiocco abbondante.

Arti posteriori: appiombi regolari; *cosce* poco muscolose; *garretti* asciutti, leggeri; *stinchi* corti e leggeri; *piedi* ben sviluppati; *pastoie* e *corona* ben sviluppata.

Caratteri sessuali: *mammella* globosa; *quarti* uniformi; *capezzoli* lunghi; *vene* sviluppate.

Difetti morfologici: pezzatura del mantello con sfumature intermedie; corna portate in basso e indietro; taglia, mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

Difetti che comportano l'inibizione alla riproduzione:

- pezzatura del mantello con sfumature intermedie;
- mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.