

CINISARA

AREA DI ORIGINE: Regione Sicilia (aree marginali costiere ed interne della zona nord occidentale della provincia di Palermo)

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI

Taglia: media

Mantello e pigmentazione: *pelle* sottile, elastica, facilmente distaccabile dai tessuti sottostanti, con pelame corto, fine e folto; *mantello* nero uniforme o con la tipica pezzatura "agghia" (nero con una fascia bianca che investe la testa, la linea dorsale, il perineo, la *coda* e la linea ventrale).

Testa: leggera a *profilo* rettilineo; *occhi* grandi, scuri e vivaci, leggermente sporgenti; *orecchie* ampie con peli corti all'esterno folti e lunghi sul bordo del padiglione auricolare tendenti al glabro internamente; *narici* nere; *musello* nero; *mascelle* lunghe e robuste; *corna* a lira, di colore nero.

Anteriore: *collo* robusto; *garrese* rilevato rispetto alla linea dorsale con punte ben ravvicinate; *spalle* forti e bene attaccate; *petto* robusto e profondo; *arti* robusti; *piedi* con unghie robuste di colore nero tendente all'ardesia.

Linea dorsale: orizzontale con lieve avvallamento; *lombi* in linea con il dorso.

Groppa: rilevata e spiovente; *coda* con attacco alto, presenta leggero rilievo delle prime vertebre caudali, con fusto robusto all'attaccatura, lungo non oltre il garretto e terminante con fiocco abbondante nero.

Arti posteriori: lunghi, con ossatura leggera; *cosce* poco muscolose, piatte; appiombi regolari; *garretti* forti; *pastoie* corte; *unghielli* duri serrati e compatti.

Caratteri sessuali: *mammella* di colore nero uniforme, leggermente pelosa, con base ampia attaccata alta posteriormente; *capezzoli* tendenzialmente lunghi e grossi; *sistema venoso* in rilievo con fontane ampie e marcate.

Difetti morfologici: macchie bianche estese all'inguine, alla mammella e in altre regioni del corpo diverse da quelle della tipica pezzatura "agghia"; evidenti sfumature rossastre del mantello; mammella di colore carnicino; taglia, mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

Difetti che comportano l'inibizione alla riproduzione:

- macchie bianche estese all'inguine, alla mammella e in altre regioni del corpo diverse da quelle della tipica pezzatura "agghia";
- mammella di colore carnicino;
- mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.