

# MODICANA

**ALTRE DENOMINAZIONI:** Siciliana

**AREA DI ORIGINE:** Provincia di Ragusa. Il tipo genetico originale è la varietà Siciliana, oggi allevata prevalentemente nelle aree interne collinari e montane della Sicilia.

**ATTITUDINE:** Duplice (Latte e Carne)

## CARATTERI TIPICI

**Taglia:** media, tendenzialmente ridotta nella varietà Siciliana.

**Mantello e pigmentazione:** *pelle* non molto spessa, elastica, facilmente sollevabile in pliche; *mantello* dal fromentino al rosso, al rosso scuro con accentuazioni fino al nero. I mantelli più scuri sono maggiormente frequenti nella varietà Siciliana.

**Testa:** **vacche** – leggera; *musello* largo; *corna* mediamente lunghe dirette verso l'alto; **tori** - forma piramidale; *fronte* larga; *musello* largo; *corna* mediamente lunghe dirette in avanti verso l'alto.

**Anteriore:** *collo* lungo nelle vacche; nei tori moderatamente più corto, largo e muscoloso; *giogaia* abbondante, con numerose pieghe, generalmente più abbondante nei maschi; *garrese* muscoloso nei tori, più sottile e rilevato nelle vacche; *spalle* aderenti al tronco; *petto* di media ampiezza; *torace* di media altezza; *arti* robusti ed asciutti; *appiombi* regolari; *piedi* robusti con unghioni di medio sviluppo di colore nero o ardesia.

**Linea dorsale:** di moderata lunghezza, diritta; *lombi* larghi non eccessivamente lunghi.

**Groppa:** spiovente con evidente sviluppo della spina sacrale; *coda* con attacco non molto alto, lunga fin sotto i garretti, più sottile nelle vacche, *fiocco* abbondante.

**Arti posteriori:** appiombi regolari; *cosce* asciutte nelle femmine, più muscolose nei maschi; *garretti* forti; *stinchi* corti e robusti; *pastoie* corte, *unghioni* ben diretti e compatti, duri di colore nero o ardesia.

**Caratteri sessuali:** *mammella* con base ampia, ben sostenuta; *quarti* di medio sviluppo; *capezzoli* non eccessivamente grossi e lunghi; *vene* evidenti e sinuose.

**Difetti morfologici:** macchie estese sulla mammella; taglia, mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

## Difetti che comportano l'inibizione alla riproduzione:

- macchie estese sulla mammella;
- mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.